

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο. Στην περίπτωση εισόδου αμέσως μετά τον ψεκασμό, ο εργάτης θα πρέπει να φοράει κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

*Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.*

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

**Εγγυημένη σύνθεση:**

*Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG 2348:* 18,8% β/ο ισοδύναμο με 24.000 I.U. *T.ni*/mg σκευάσματος  
Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 100% β/β

# CORDALENE SC

*Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain EG2348*  
(Βάκιλλος Θουριγγίας)

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 14576/ 02.08.2016

Κάτοχος της έγκρισης: CBC (Europe) S.r.l., Via Zanica 25,  
24050 Grassobio (BG), Ιταλία

Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6726381



Εργοστάσιο συσκευασίας:

**PHYTORGAN**

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ  
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr

Βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου  
με εκλεκτική δράση  
κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Περιέχει τον μικροοργανισμό *Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki strain EG2348*. Οι μικροοργανισμοί ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

Ημερομηνία παραγωγής / Αρ. Παρτίδας:  
Βλέπε συσκευασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

**50 Κ. ΕΚ.**



ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

**Γενικές πληροφορίες:** Μη δίνετε υγρά και μην προκαλείτε εμετό, εάν ο παθών έχει σπασμούς ή είναι αναισθητός.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.

**Σε περίπτωση δηλητηρίασης:** Καλέστε αμέσως γιατρό για την παροχή πρώτων βοηθειών.

**Αντίδοτο:** Συμπτωματική θεραπεία.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Το CORDALENE SC είναι βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου, με εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα διά της κατάποσης, μετά την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

**Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται με ψεκάσμο καλύψεως φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά τη συσκευασία πριν το άνοιγμά της. Γεμίστε το βυτίο με νερό μέχρι τη μέση και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Συμπληρώστε το νερό στο βυτίο αναδεύοντας συνεχώς. Ξεπλύνετε τη φιάλη 3 φορές και ρίξτε τα νερά στο βυτίο. Ψεκάστε το διάλυμα αμέσως μετά την προετοιμασία του.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Τριπλό ξέπλυμα με νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας :** Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή αποκλειστεί:** Αποφεύγετε τη χρήση νερού με pH>8, εκτός κι αν χρησιμοποιήσετε παράγοντα οξίνισης. Σε περίπτωση μίγματος με άλλο φ.π.

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οδηγίες (περιορισμοί κλπ) που ισχύουν και περιγράφονται στην ετικέτα του άλλου φ.π.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής. Προσοχή να δίνεται όταν αναμιγνύεται το προϊόν με άλλα προϊόντα προερχόμενα από έλαια ή επιφανειοδραστικά αφού τέτοιος συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, δοκιμάστε το σε μια μικρή περιοχή. **Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα όπως βορδιγάλειος πολτός, κ.ά.

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:** —

**Συνθήκες αποθήκευσης - Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να φυλάσσεται σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο. Σε θερμοκρασία 20°C, παραμένει σταθερό για 3 χρόνια.

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Σε όλες τις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής.

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

- **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά): Κατά των φυλλοδετών και των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.
- **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά): Κατά των: καρπόκαφα, βλαστορύκτη, φυλλοδετών, φυλλοφάγων καμπιών και υπονομευτών. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.
- **ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ**: Κατά της Εούλιας. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.
- **ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ** (Γκρέιπ φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Κιτριδιά): Κατά του Ανθοτρήτη. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 200-400 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.
- **ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, ΦΥΣΤΙΚΙΑ**: Κατά των φυλλοδετών, των φυλλοφάγων καμπιών και των υπονομευτών. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος

Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ**: Κατά των φυλλοδετών. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΕΛΙΑ**: Κατά του Πυρηνοτρήτη. Δόση: 70-140 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΑΜΠΕΛΙ** (Οινοποίηση & επιτραπέζιο): Κατά της Ευδεμίδας και της Κογκυλίδας. Δόση: 50-100 κ.εκ./100 λίτρα νερό (75-100 κ.εκ./στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 10-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΣΟΛΑΝΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Υ/Θ** (Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα): Κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 100-200 κ.εκ./ στρ. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΦΥΛΛΩΔΗ ΚΑΙ ΚΡΑΜΒΟΕΙΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Υ/Θ** (Κουνουπίδι, Λάχανο, Αγκινάρα, Μαρούλι, Μπάμπια, Πράσα): Κατά των προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής:

Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΒΑΜΒΑΚΙ**: Κατά του πράσινου ακουληκίου και του ρόδιου ακουληκίου. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ**: Κατά της Πυραλίδας, του πράσινου ακουληκίου και της σεζάμιας. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-80 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΚΑΠΝΟΣ**: Κατά του πράσινου ακουληκίου. Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 50-150 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ (Υ/Θ)**: Κατά των φυλλοφάγων και ανθοφάγων προνυμφών. Δόση: 40-66,7 κ.εκ./100 λίτρα νερό (100-200 κ.εκ./ στρέμμα). Όγκος Ψεκ. υγρού: 200-300 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.

- **ΔΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ**: Κατά των φυλλοφάγων προνυμφών (Πιτυοκάμπη, Λυμάντρια, Υφάντρια, Μαλακόσωμα). Δόση: 100-200 κ.εκ./στρέμμα. Όγκος Ψεκ. υγρού: 60-200 λίτρα/στρ. Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφών (L1-L2) με μεσοδιαστήματα 7-10 ημερών. Μεγ. αριθμ. εφαρμ./καλ.περίοδος: 3.