

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**

• Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
• Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής αμέσως μετά τον ψεκασμό.
Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

ΠΡΑΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ, ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Εισπνοή: Σε περίπτωση εισπνοής των αναθυμιάσεων, μετακινήστε το άτομο σε καθαρό αέρα. Αν η αναπνοή είναι ακανόνιστη, ζητήστε ιατρική συμβουλή. **Επαφή με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Κρατήστε τα βλέφαρα μακριά από το βολβό του ματιού για λεπτομέρες ξέπλυμα. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμείνει. **Επαφή με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το φάρμακο και ξεπλύνετε τα πριν τα χρησιμοποιήσετε ξανά. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια αν ο ερεθισμός παραμείνει. **Κατάποση:** Ξεπλύνετε το στόμα, πείτε νερό. Αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. **Αντιδοτό:** δεν υπάρχει γνωστό αντιδοτό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι του σημείου απορροής ή στοχευμένοι ψεκασιμί.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώνουμε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τη χρήση, καθαρίστε τον εξοπλισμό ψεκασιμού λεπτομέρες. Στραγγίστε το σύστημα στο σύνολό του και ξεπλύνετε τη δεξαμενή ψεκασιμού, τη βέργα και τα ακροφύσια δύο έως τρεις φορές με καθαρό νερό μέχρι ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος να απομακρυνθούν.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προποστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια

αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Καμία.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν θα πρέπει να εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τις επιφάνειες των φύλλων.

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συστασόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Επίσης, παραμένει σταθερό μετά από 8 εβδομάδες αποθήκευσης στους 40°C.

GIBBER[®] 4SL

GIBBERELLIC ACID (ΓΙΒΒΕΡΕΛΛΙΚΟ ΟΞΥ) 4%

Εγγυημένη σύνθεση:
Gibberellic acid 4% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 95,83% β/β

Πυκνό Διάλυμα (SL)
Αρ. Εγκρ. Κυκλ.: 8244/07.03.2016

Το γιββεριλλικό οξύ είναι μια φυσική ορμόνη των φυτών που δρα ως ρυθμιστής ανάπτυξης, διεγείροντας τη διαίρεση και την επιμήκυνση των κυττάρων με αποτέλεσμα να οδηγεί σε αυξημένη καρπόδεση και καλλιεργητικές αποδόσεις.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1 ΛΙΤΡΟ



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

PHYTOrgan

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • FAX: 210 62 51 869

**ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

- **Αγλαδία:** Για αύξηση της καρπόδεσης και διέγερση της φυσιολογικής ανάπτυξης του καρπού. **Δόση:** 30 κ.εκ./στρ. (max) - 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Εναρξή στα 20-30% της άνθησης έως τέλος άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1.
 - **Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια / άσπεριες ποικιλίες: Σουλτανίνα, Thompson, ...):** Για αύξηση του μήκους των τασιμάτων. **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max) - 75-250 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 30-100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστούς μήκους 4-8 cm. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1.
 - **Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια / άσπεριες ποικιλίες: Σουλτανίνα, Thompson, ...):** Για αραίωση. **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max) - 75-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στο 30-40% της άνθησης. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1.
 - **Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια / άσπεριες ποικιλίες: Σουλτανίνα, Thompson, ...):** Για αύξηση του μεγέθους της ράγας και μεγαλύτερη ομοιογένεια της παραγωγής. **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max) - 75-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 60-100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την καρπόδεση μέχρι διάμετρο ράγας 3-4 mm. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1-2 (8 ημέρες)¹.
 - **Αμπέλι (επιτραπέζια σταφύλια):** Για αύξηση της καρπόδεσης και πρώιμης της συγκομιδής. **Δόση:** 75 κ.εκ./στρ. (max) - 75 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση (70% πτώση των πετάλων) και 5-12 ημέρες αργότερα. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 2 (5 ημέρες)².
 - **Αμπέλι:** Για αύξηση του μήκους των τασιμάτων. **Δόση:** 12,5 κ.εκ./στρ. (max) - 12,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν την άνθηση σε βλαστούς μήκους 10-15 cm. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1.
 - **Αμπέλι (για παραγωγή σταφίδας):** 1) Για αύξηση του μεγέθους της ράγας. **Δόση:** 25 κ.εκ./στρ. (max) - 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Μέγεθος ράγας 3 mm.
- Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1³.
2) Για μείωση της πτώσης ανθέων και καρπών. **Δόση:** 12,5 κ.εκ./στρ. (max) - 12,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Στην πλήρη άνθηση. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1⁴.
- **Πορτοκαλιά:** Για βελτίωση της ποιότητας του φλοιού. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (max) - 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1.
 - **Κλημενίνες, Μανταρινιά:** Για διέγερση της καρπόδεσης. **Δόση:** 25 κ.εκ./στρ. (max) - 25 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Από την πλήρη άνθηση έως στα 2/3 της πτώσης των πετάλων. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 2 (7 ημέρες).
 - **Λεμόνια:** Για καθυστέρηση της συγκομιδής, μείωση του αριθμού των μικρών καρπών και αύξηση του μεγέθους των καρπών. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (max) - 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Πριν τον χρωματισμό των καρπών. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 1.
 - **Αγκινάρα:** Για πρώιμη της παραγωγής και καλύτερη ποιότητα. **Δόση:** 50 κ.εκ./στρ. (max) - 50-125 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. **Όγκος ψεκ. υγρού:** 40-100 λίτρα/στρ. **Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:** Ψεκασιμί πλήρους κάλυψης μέχρι σημείου απορροής. Ο πρώτος ψεκασιμός κατά τον σχηματισμό του κεντρικού άνθους. **Μέγιστος αριθ. εφαρμ./καλ. περίοδο:** 3 (15 ημέρες).
- Παρατηρήσεις:**
- ¹ Άσπεριες ποικιλίες (Σουλτανίνα, Thompson, ...).
 - ² Σουλτανίνα. Θα πρέπει να δοθεί προσοχή για καλή κάλυψη των σταφυλιών. Ψεκασιμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ενα προσοκλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασιμού.
 - ³ Σουλτανίνα. Ψεκασιμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ενα προσοκλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασιμού.
 - ⁴ Μαύρη Κορινθιακή. Ψεκασιμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας. Ενα προσοκλητικό θα πρέπει να προστεθεί στη δεξαμενή ψεκασιμού.
 - ⁵ Η αζωτογύκος λίπανση και η άρδευση θα πρέπει να αυξηθεί. Ψεκασιμός κατά τις κρύες ώρες της ημέρας.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε συσκευασία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

