



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Αθήνα, 20 – 10 - 2014
Αριθ. πρωτ: 11189/124932**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: syg046@minagric.gr**

**Προς: CHIMAC AGRIPHAR S.A. Βελγίου
(δια της AGRIPHAR HELLAS ΑΕΕΒΕ,
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ
Τ.Θ. 92, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19300)**

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 6678 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) PROMESS 72,2 SL (δ.ο. propanoic acid hydrochloride), ως προς το φάσμα δράσης, τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις επικινδυνότητας (πρώην φράσεις κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/09 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστ. Φυτ. Παραγωγής.
4. Τον Κανονισμό 289/2014 της Επιτροπής της 21^{ης} Μαρτίου 2014 “για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων των ουσιών *foramsulfuron*, *azimsulfuron*, *iodosulfuron*, *oxasulfuron*, *mesosulfuron*, *flazasulfuron*, *imazosulfuron*, ***propanoic acid***, *bifenazate*, *chlorpropham* και *thiobencarb* μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα”.
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
6. Τις με αριθ. πρωτ. 3237/36918/18.3.14 και 11189/124932/7.10.14 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας AGRIPHAR HELLAS ΑΕΕΒΕ για λογαριασμό της εταιρείας CHIMAC AGRIPHAR S.A. Βελγίου.
7. Το σχετικό Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την με αριθ. **6678** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **PROMESS 72,2 SL** (δ.ο. propramocarb hydrochloride), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 84250/23.7.1997 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 122852/25.9.2008 και 1818/22283/12.11.12 Αποφάσεις μας:

- α) ως προς το φάσμα δράσης, προκειμένου τα αναμενόμενα υπολείμματα propramocarb από τη χρήση του σκευάσματος στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα να είναι κάτωτερα από τα νέα θεσπισθέντα με τον Κανονισμό 289/2014 όρια,
- β) ως προς τα εικονογράμματα κινδύνου (πρώην σημάνσεις), τις δηλώσεις επικινδυνότητας (πρώην φράσεις κινδύνου) και τις δηλώσεις προφύλαξης (πρώην φράσεις προφύλαξης), ώστε η σήμανση του σκευάσματος να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008.

Οι παράγραφοι 5, 9, 10 και 11 της με αριθ. 122852/25.9.2008 Απόφασής μας, διαμορφώνονται ως ακολούθως:

5. Φάσμα δράσης:**Εφαρμογή στο έδαφος:**

Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
		κ.εκ.σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρό	Λίτρα ή κ.εκ. διαλύματος / μονάδα εφαρμογής	
Τομάτα (Y+Θ) Πιπεριά (Y+Θ) Αγγούρι (Y+Θ) Καπνός (Y+Θ)	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>) Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>)	250	2-4 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο	α. Σπορεία, αμέσως μετά τη σπορά. Μία εφαρμογή.
		150	100 κ.εκ. διαλύματος ανά φυτό	β. Μία εφαρμογή με πότισμα, κατά τη μεταφύτευση.
Καλλωπιστικά (Y+Θ)	Πύθιο (<i>Pythium spp.</i>) Φυτόφθορα (<i>Phytophthora spp.</i>)	250	2-4 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο σπορείου	α. Σπορεία, πριν ή μετά τη σπορά.
		150	5-10 λίτρα διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο εδάφους	β. Φυτώρια, με πότισμα πριν τη φύτευση των μοσχευμάτων ή εμφύτευση των ριζών των μοσχευμάτων που ριζοβόλησαν πριν τη μεταφύτευση.
		150	100-200 κ.εκ. διαλύματος ανά γλάστρα διαμέτρου 10-12 εκ.	γ. Γλάστρες, με πότισμα αμέσως μετά τη φύτευση και επανάληψη μετά 3-6 εβδομάδες εάν χρειαστεί.
		300		δ. Βολβοί: Εμβάπτιση στο διάλυμα για 20 λεπτά πριν τη φύτευση.

Παρατήρηση: Για ομοιόμορφη διαβροχή και καλύτερη αποτελεσματικότητα του σκευάσματος πρέπει το έδαφος να είναι υγρό. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούμε αρκετό νερό ώστε το διάλυμα να διεισδύσει πλήρως στη ζώνη των ριζών.

Εφαρμογή στο φύλλωμα:						
Καλλιέργειες	Ασθένειες	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ.σκευάσματος /100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα	κ.εκ. / στρέμμα		
Αγγούρι θερμοκηπίου	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-300	50-100	100-300	Από το στάδιο που τα φυτά έχουν αποκτήσει 3-4 φύλλα.	3/8-10
Πεπόνι υπαίθρου, θερμοκηπίου		200-300	50-100	100-300		3/8-10
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	200-300	50	100-150	Από το στάδιο που τα φυτά έχουν αποκτήσει 4-6 πραγματικά φύλλα.	3/10-14

Παρατηρήσεις:

-Στις εφαρμογές στο φύλλωμα η δόση των 300 κ.εκ. ανά 10 ημέρες για την πατάτα και ανά 8 ημέρες για αγγούρι και πεπόνι, συνιστάται σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ευνοϊκών για την ασθένεια συνθηκών ή για θεραπευτικές εφαρμογές.

-Για τις ανωτέρω καλλιέργειες να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου αυτά εφαρμόζονται.

9. ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ:

Προειδοποιητική λέξη:
ΠΡΟΣΟΧΗ

**GHS07****10. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:**

H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Περιέχει propamocarb hydrochloride.

11α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά γυαλιά.
P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333 + P313

11β. Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου (ΕUH):

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Παρατήρηση: Η ανωτέρω ταξινόμηση και επισήμανση που είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, θα είναι υποχρεωτική από την 1^η Ιουνίου 2015. Μέχρι τότε το σκεύασμα δύναται να κυκλοφορεί με τη σήμανση που αναγράφεται στη με αριθ. 122852/25.9.2008 Απόφασή μας.

Β. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 122852/25.9.2008 Απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 1818/22283/12.11.12 Απόφασή μας.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
α/α

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ