

THIOQUIM 80 WG

SULPHUR - ΘΕΙΟ 80%

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη σύνθεση:

Sulphur 80% β/β

Βοηθητικές ουσίες 19,2% β/β

Αριθμός Έγκρισης

Κυκλοφορίας:

60.526/12-05-2016

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ - ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη.
 - Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 - «Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση».
 - «Φοράτε κατάλληλα γάντια, προστατευτικά ενδύματα και μπότες κατά την εφαρμογή».
 - «Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση που εισέλθουν στον αγρό μετά την εφαρμογή».
- Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τα κενά συσκευασίας του.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

- Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Μην κορηγήσετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

Παρασκευαστής - Εργοστάσιο παρασκευής: QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. Los Yacimientos 1301, Maipú, Santiago, Χιλή
Κάτοχος της έγκρισης: QUIMETAL INTERNACIONAL REGISTROS E INVERSIONES S.L. Los Torneros 14, Polígono Ind. Los Angeles, 28906 Getafe, Madrid, Ισπανία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: LANCES LINK ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Πατησίων 77-79, 104 34 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 5578797



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

PHYTOrgan

ΠΕΡΙΒΟΙΑΣ 6 • 145 64 ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ. 210 62 52 600 • www.phytorgan.gr



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ:

Επί της συσκευασίας

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών (min)
		γραμ./100 λίτρα φεκ. υγρού	Όγκος φεκ. υγρού λίτρα/στρέμμα	Μέγιστη ποσot. σκ. γραμ/στρέμμα		
Μηλιά Αχλαδιά		400	100-200	800	Στα στάδια πρόδησης και ρόδινης κορυφής.	4/7
	Ίδιο	200-300		600	Στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	
	Φουζικλάδιο	500	100-200	1000	Στα στάδια πρόδησης και ρόδινης κορυφής, στην πτώση των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά	Ίδιο	300-400	150-250	1000	Στα στάδια πτώσης πετάλων απόσπασης του κάλκα και στάδιο καρπιδίου και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	4/7
Ελιά (ποικιλία ελιά Χαλκιδικής)	Ακάρεια της οικογένειας <i>Eriophyidae</i>	320	100-120	384	Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων σφαιρών (Απρίλιο) και κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας).	2/30
Αμπέλι (ονοποισίμες και επι- τραπέζιες ποικιλίες)		200-400	50-100	400	Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκατ.	8/7
	Ίδιο	100-200	50-150	300	Κατά την άνθηση, μετά το δέσιμο των ραγών και κάθε 15-20 ημέρες μέχρι το στάδιο του φυλλοπτώσης των ραγών ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.	
	Ερίνωση	1000	50-150	1500	Έναρξη έκπτυξης των σφαιρών.	
Τομάτα (Υ)	Ίδιο		40-100	200	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επαλληλη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	6/10
Τομάτα (Θ)	Ίδιο		50-100	300		4/10-15
Μελιτζάνα, πιπεριά	Ίδιο		50-100	300	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επαλληλη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	4/10-15
Κολοκυνθοειδή: -αγγούρι, -κολοκούθι, -πεπόνι, -καρπούζι	Ίδιο		50-80	240	Με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επαλληλη ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	4/10-15
	Ζαχαρό- τεύτλα	Ίδιο	30	750	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	3/10
	Τετράνυκος	240-480	40-100	480	Με την έναρξη της προσβολής και επαλληλη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής.	
Τριαντα- φυλλιά	Ίδιο	200-300	50	150	Μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και επαλληλη ανάλογα με την ένταση της προσβολής	4/7

Παρατηρήσεις: 1. Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με το στάδιο ανάπτυξης του φυτού. 2. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών. 3. Να ακολουθούνται τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων (στις περιόδους που εφαρμόζονται). 4. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών. 5. Το θεαίρι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C. 6. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20°C. 7. Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλυθεί: Στην καλλιέργεια του αμπέλιου να μην εφαρμόζεται πολύ κοντά στη συγκομιδή καθώς αφήνει σημάδια πάνω στους καρπούς.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδευση. Το ψεκαστικό διάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 24 ώρες από την παρασκευή του αφού προηγηθεί ισχυρή αναδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, δύο-τρεις φορές με καθαρό νερό. Επιπρόσθετο το θεαίρι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστήρες πρέπει να πλένονται καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με παραρνητικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακιά, σάκοι) μαζί με τα κομμάτια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με ακτίνα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό στα φυτά.

Στοιχεία φωτοεξοχέτησης, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: • Μη χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μέσα σε 4 εβδομάδες πριν την εφαρμογή πολτού, γιατί προκαλεί φωτοεξοχέτιση. • Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 30°C) μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στα φυτά. • Μπορεί να προκαλέσει φωτοεξοχέτιση στα κολοκυνθοειδή, καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς και βερικοκιάς, κάτω από συνθήκες υψηλής ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά	7
Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)	90
Αμπέλι (ονοποισίμες και επιτραπέζιες ποικιλίες)	5
Τομάτα (Υ)	3
Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα, Πιπεριά	7
Κολοκυνθοειδή (Αγγούρι, Κολοκούθι, Καρπούζι, Πεπόνι)	7
Ζαχαρότεύτλα	μη εφαρμοσίμο

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από εστίες φωτιάς. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ / ΑΡΙΘ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε συσκευασία